

Distribución F (Fisher-Snedecor)

La distribución F con m y n grados de libertad se define como: $W = \frac{X/m}{Y/n} \sim F_{m,n}$, donde $X \sim \chi^2_m$, $Y \sim \chi^2_n$ independientes. Su densidad es: $f_W(w) = \frac{\Gamma(\frac{m+n}{2})}{\Gamma(\frac{m}{2})\Gamma(\frac{n}{2})} \left(\frac{w}{1+w}\right)^{\frac{m}{2}} \left(\frac{1}{1+w}\right)^{\frac{n}{2}}$, $w > 0$

Explora la distribución F

Grados de libertad m (numerador): 5 Grados de libertad n (denominador): 10

Propiedades de la distribución F:

- Si $T \sim t_n$ (t-Student), entonces $T^2 \sim F_{1,n}$
- $W^{-1} \sim F_{n,m}$ (recíproca)
- $E[W] = \frac{n}{n-2}$ para $n > 2$
- $\text{Var}(W) = \frac{2n^2(m+n-2)}{m(n-2)^2(n-4)}$ para $n > 4$
- Percentiles: $F(p; m, n) = \frac{1}{F(1-p; n, m)}$

Relación con la t-Student

Si $T \sim t_n$, entonces $T^2 = \frac{Z^2}{\chi^2_n/n}$.
Como $Z^2 \sim \chi^2_1$, tenemos $T^2 \sim \frac{\chi^2_1}{\chi^2_n/n} = \frac{\chi^2_1/1}{\chi^2_n/n} \sim F_{1,n}$.
Por lo tanto, el cuadrado de una t-Student sigue una F con (1, n) grados de libertad!

Ejemplo de aplicación: En ANOVA, la estadística $F = \frac{\text{MSB}}{\text{MSW}}$ sigue una distribución $F_{k-1, N-k}$ bajo la hipótesis nula.
Para $(m=3, n=12)$, el valor crítico al 95% es aproximadamente 3.49.

¿Qué le pasa a la distribución F cuando m y n crecen?

Cuando $n \rightarrow \infty$, $F_{m,n}$ converge a χ^2_m/m (una chi-cuadrada escalada).
Cuando $m \rightarrow \infty$, el comportamiento es similar. En la práctica, para grados de libertad

grandes (>100), la distribución F se aproxima a una normal.

Ejercicio

Usando la propiedad de reciprocidad $(W^{-1} \sim F_{n,m})$ (mencionada arriba), derive la relación de percentiles $(F(p;m,n) = 1/F(1-p;n,m))$.

Por definición, $(F(p;m,n))$ es el valor tal que $(\mathbb{P}(W \leq F(p;m,n)) = p)$, donde $(W \sim F_{m,n})$. Esta desigualdad es equivalente a: $(\mathbb{P}(\frac{1}{W} \geq \frac{1}{F(p;m,n)}) = p)$, es decir, $(\mathbb{P}(\frac{1}{W} < \frac{1}{F(p;m,n)}) = 1-p)$. Pero por la propiedad de reciprocidad, $(1/W \sim F_{n,m})$. Por definición de percentil aplicada a $(1/W)$, el valor (v) tal que $(\mathbb{P}(1/W \leq v) = 1-p)$ es exactamente $(v = F(1-p;n,m))$. Comparando ambas expresiones: $(F(1-p;n,m) = \frac{1}{F(p;m,n)}) \Leftrightarrow F(p;m,n) = \frac{1}{F(1-p;n,m)}$. Esta identidad es la razón práctica por la que las tablas de la distribución F solo publican percentiles altos (como 0.95 o 0.99): los percentiles bajos se obtienen invirtiendo y cambiando el orden de los grados de libertad.

Revision #1

Created 2026-09-11 17:42:37 UTC by Cheque Soto

Updated 2026-09-11 17:42:37 UTC by Cheque Soto