

Estadísticos de Orden - Definición

Sea $(X_1, \dots, X_n)$ una **muestra aleatoria** (i.i.d.) de una población con función de distribución $F(\cdot)$. Los **estadísticos de orden** son las variables ordenadas: $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ donde $X_{(1)} = \min\{X_i\}$, $X_{(n)} = \max\{X_i\}$.

Simulador: Muestra aleatoria y estadísticos de orden

Tamaño de muestra n:

8 Distribución:

Generar nueva muestra

Aplicaciones:

- **Sistemas en serie:** El tiempo de vida es $X_{(1)}$ (el más débil falla primero)
- **Sistemas en paralelo:** El tiempo de vida es $X_{(n)}$ (el último en fallar)
- **Control de calidad:** El rango $R = X_{(n)} - X_{(1)}$ mide la variabilidad

¿Qué representa la mediana muestral en términos de estadísticos de orden?

Si n es impar, la mediana es $X_{((n+1)/2)}$ (el estadístico de orden central). Si n es par, la mediana es $\frac{1}{2}(X_{(n/2)} + X_{(n/2+1)})$.

Ejercicio

(Barrios y colaboradores, Cuaderno de Ejercicios CP2, sección 13, ej. 1) Considere $(X_1, \dots, X_n)$ una muestra aleatoria de una población distribuida uniformemente en $(0, \theta)$. Considere los estimadores $\tilde{\theta}$ y $\hat{\theta}$ del parámetro θ dados por $\tilde{\theta} = 2\bar{X}$, $\hat{\theta} = \frac{n+1}{n}X_{(n)}$. Muestre que ambos son estimadores insesgados de θ , es decir, $E[\tilde{\theta}] = \theta$ y $E[\hat{\theta}] = \theta$.

Para $\tilde{\theta}$: como $X_i \sim \text{Unif}(0, \theta)$, $E[X_i] = \theta/2$, así que

$E[\bar{X}] = \theta/2$ y $E[\tilde{\theta}] = 2, E[\bar{X}] = 2 \cdot \frac{\theta}{2} = \theta$. Para $\hat{\theta}$, necesitamos $E[X_{(n)}]$. Usando $f(x) = x/\theta$ y la fórmula del máximo (módulo siguiente), $f_{X_{(n)}}(x) = n f(x) [F(x)]^{n-1} = \frac{n}{\theta^n} x^{n-1}$ para $0 \leq x \leq \theta$. Entonces: $E[X_{(n)}] = \int_0^\theta x \cdot \frac{n}{\theta^n} x^{n-1} dx = \frac{n}{\theta^n} \cdot \frac{\theta^{n+1}}{n+1} = \frac{n}{n+1} \theta$. Por lo tanto: $E[\hat{\theta}] = \frac{n+1}{n} \cdot \frac{n}{n+1} \theta = \theta$. Ambos estimadores son insesgados, aunque tienen varianzas distintas — de hecho, $\hat{\theta}$ (basado en el máximo) resulta tener menor varianza para n grande, lo que lo hace preferible en la práctica.

Revision #1

Created 2026-09-11 17:42:36 UTC by Cheque Soto

Updated 2026-09-11 17:42:36 UTC by Cheque Soto